

Analgésicos postoperatorios

- Si le recetaron hidrocodona (Norco) u oxycodona acetaminofén (Percocet):
Úselo según lo recetado.
 - Tomar con alimentos y beber muchos líquidos
 - No tome más de 8 tabletas de su medicamento recetado en 24 horas
 - **Advertencia: No puede** tomar Tylenol adicional (acetaminofén) mientras toma estos medicamentos (ya contienen Tylenol)
- Puede tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para ayudar con el dolor mientras toma estos medicamentos. Entre ellas se encuentran:
 - Advil/Motrin (ibuprofeno): 400 a 600 mg hasta 3 veces al día *con alimentos*
 - Aleve (Naprosyn) – Dos veces al día *con comida*
 - **Advertencia:** No tome estos medicamentos adicionales si tiene antecedentes de úlceras o reflujo significativo
- Comience a reducir los medicamentos después del 3.er al 5.º día después de la cirugía. Reduzca gradualmente a una pestaña cada 4-6 horas
- Sus medicamentos recetados (hidrocodona/Norco o Percocet) pueden causar estreñimiento. La mejor manera de prevenir esto es dejar de tomar los medicamentos recetados lo antes posible. Beba muchos líquidos y tome un ablandador de heces, como Colace/Docusate, si es necesario mientras toma los analgésicos recetados.

Si tiene preguntas sobre sus medicamentos postoperatorios, llame al consultorio de su médico al 972-470-5000***